

Бюджетное учреждение
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
**«Когалымская городская
больница»**



**ОТРАВЛЕНИЕ
СУРРОГАТАМИ АЛКОГОЛЯ**
– интоксикация, обусловленная употреблением этилового спирта, содержащего различные примеси, либо другими одноатомными и многоатомными спиртами.

**ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ
ДОВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ**

Наиболее распространенными причинами отравлений истинными суррогатами являются прием денатурата, политуры, этиленгликоль, ацетон, спиртовой морилки для дерева, медицинских препаратов на спиртовой основе, спиртосодержащих косметических средств, самогона.

Отравление суррогатами алкоголя, не содержащими этанол, развивается после приема метанола, а также тормозной жидкости и антиобледенителей на основе этиленгликоля, средства бытовой химии.

СИМПТОМЫ ОТРАВЛЕНИЯ:

Легкая форма: тошнота, неоднократная рвотой, головная боль, головокружение, боль в эпигастрии, нерезко выраженным расстройствами зрения – мельканием мушек, нарушением четкости восприятия («видно, как сквозь туман»).

Средняя тяжесть: проявления аналогичные, но все симптомы выражены более ярко. Спустя 1-2 дня больной теряет зрение.

Тяжелой формы: сонливость и оглушенность. Через несколько часов появляются жажда, боли в ногах, сухость и синюшность слизистых, нарушения ритма сердца, замедление сердцебиения и падение АД.

Итогом становится кома и смерть в результате остановки дыхания и нарушений работы сердца.

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ ДО ПРИЕЗДА СКОРОЙ ПОМОЩИ:

Пострадавший в сознании:

1. Вызовите «скорую помощь»
2. Немедленно промойте пострадавшему желудок. Для этого нужно дать выпить пострадавшему 4-5 стаканов воды комнатной температуры, после чего вызвать рвоту, осторожно надавив на корень языка ложкой или пальцем
3. После очищения желудка нужно использовать сорбенты, солевые слабительные
4. Если точно известно, что человек отравился метиловым спиртом, можно дать небольшое количество этилового алкоголя (примерно 50 мл), это в определенной степени задержит разложение метанола на ядовитые вещества
5. Дайте пострадавшему выпить крепкого сладкого чая или кофе. Кофеин способствует стимуляции дыхания и деятельности сердечнососудистой системы

Пострадавший без сознания:

1. Вызовите «скорую помощь»
2. Дайте ему вдохнуть пары нашатырного спирта, чтобы он пришел в сознание.
3. Если у больного отсутствует дыхание, начинайте реанимационные мероприятия.

**ОТРАВЛЕНИЕ
СУРРОГАТАМИ АЛКОГОЛЯ
МОЖЕТ СТОИТЬ ЖИЗНИ!**